



# PASOS PARA UNA INFUSIÓN

## \*Poner el medicamento en una vena



### Paso 1:

## CONFIGURAR



- Reúna todos los suministros necesarios.
- Verifique la etiqueta para asegurarse de tener el medicamento y la dosis correctos.
- Asegúrate de que no esté caducado. Comprobar Fecha.
- Mire el medicamento para ver si pareciera diferente de lo habitual. No lo use si se ve diferente.
- Deje que el medicamento alcance la temperatura ambiente.
- Limpie su área de trabajo con una gasa esterilizada con alcohol.
- Lávese las manos y los brazos con jabón y agua tibia. Ponte los guantes.



### Paso 2:

## PREPARE EL MEDICAMENTO



- Retire la tapa de la parte superior del vial y limpie la parte superior con una gasa estéril con alcohol.
- Tome la jeringa y conecte la aguja o el dispositivo de transferencia/filtro, si aún no lo está. Esta aguja o dispositivo se usará para llenar la jeringa. No entrará en el cuerpo. No toque las partes de la aguja y la jeringa que se conectan.
- Retire la tapa de la aguja de transferencia y déjala a un lado.

- Inserte la aguja en el centro de la parte superior del vial.
- Gire el vial boca abajo con la aguja insertada.
- Inyecte el aire con la punta de la aguja por encima del medicamento para evitar burbujas de aire.
- Baje la punta de la aguja en el medicamento y tire suavemente del émbolo para extraer la dosis del medicamento recetado.
- Lance cualquier burbuja de aire hacia la parte superior de la jeringa y empuje el aire hacia el vial.
- Si la jeringa se ha sobrellenado, empuje el exceso nuevamente dentro del vial. Es posible que necesite usar una jeringa adicional.
- Una vez que haya terminado de llenar la jeringa con medicamento, retire la aguja del vial mientras aún está boca abajo.
- Si la dosis prescrita requiere más de un vial, deberá combinar el medicamento. Lea cómo combinar más de un vial en la hoja de instrucciones del paquete del medicamento.
- Retire la aguja de transferencia de la jeringa y aplique la aguja de mariposa (infusión). Esta aguja debe permanecer estéril hasta que la inserte en la piel.



**Paso 3:**  
**ENCUENTRA UNA VENA**



- Encuentre una posición cómoda y descance el brazo sobre una superficie firme.
- Use un torniquete para ayudarlo a decidir la mejor vena para usar. Colóquelo de 3 a 6 pulgadas por encima del sitio de infusión.
- Si busca una vena en el brazo, es útil cerrar el puño. Use su dedo para sentir y seguir la dirección de la vena.
- Consejos para encontrar una vena:
  - Gently slap the skin near the infusion site
  - Apply a warm washcloth to the area
  - Make sure you are well hydrated
- Limpie el área con una toallita estéril con alcohol y deje secar al aire.



**Paso 5:**  
**TERMINAR Y LIMPIAR**



- Compruebe si hay sangrado o reacciones adversas.
- Una vez que haya terminado de aplicar presión, coloque un vendaje en el lugar de la infusión.
- Deseche los frascos de medicamentos.
- Si derramó algún medicamento o si hay sangre en su área de trabajo, use lejía con cloro para limpiarla.
- Asegúrese de registrar su tratamiento en su registro de tratamiento.



**Paso 4:**  
**INFUNDIR**



- Con el bisel hacia arriba (parte angulada de la aguja), inserte la aguja en la vena en un ángulo de 30 grados (no plano ni recto hacia abajo).
- Una vez que la aguja esté en la piel, ajústela para que penetre un poco más en la vena.
- Tire ligeramente hacia atrás de la jeringa para verificar si hay un retorno de sangre que le permita saber si está en la vena.
- Abra el torniquete e infunda lentamente el medicamento. Mire el sitio para cualquier problema como dolor, enrojecimiento o hinchazón. Deténgase si esto sucede. Tendrá que reiniciar en la sección Encontrar una vena anterior.
- Retire la aguja y aplique presión con una gasa limpia durante al menos 5 minutos.
- Deseche todas las agujas en un recipiente para objetos punzocortantes.

**Mis Notas**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---